

Stappenplan voor de aanleg van een broedhoop voor ringslang



peter.engelen73@telenet.be



Stap 1

Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. Kies een zonnige ligging met beschutting in de vorm van bosranden, houtkanten, heggen of dichte ruigtevegetaties.

Het opzetten van een broedhoop kan tot eind april.



Stap 2

Op de grond komt eerst een laag dikkere stammen. Hierdoor kunnen ringslangen langs de onderkant het midden van de hoop bereiken en krijg je een betere zuurstofrijke broei.



Stap 3

Hierover komt een 20-25 cm dikke laag maaisel of hooi.



Stap 4

Daarover een 15 cm dikke laag bladeren.



Stap 5

Aan één kant worden 4 kruiwagens paardenmest voorzien. Dit is de katalysator van de hoop.

Meestal worden de eieren rechtstreeks tegen dit mest afgezet.

De temperatuur in de hoop moet constant rond de 25 tot 30°C zijn.



Stap 6

Over de paardenmest komt een 10 cm dikke laag bladeren.



Stap 7

Aan de andere kant komen 4 kruiwagens haksel. Dit is een experiment. In andere gebieden maakt men soms gebruik van haksel. Door dit te verwerken in dezelfde hoop als de paardenmest kunnen we de voorkeur bekijken.



Stap 8

Over het houthaksel komt een 10 cm dikke laag bladeren.



Stap 9

Daarna weer een 20-25 cm dikke laag maaisel of hooi.



Stap 10

Hierop plaatsen we een laag dun takhout.

Het is belangrijk dat het materiaal voldoende los is, zodat een ringslang er gemakkelijk in kan kruipen.



Stap 11

Weer een 10-15 cm dikke laag bladeren waardoor een gedeelte van de openingen tussen de takken opgevuld worden.



Stap 12

Daarna 5 cm dunne laag extra houthaksel over de hoop gooien.



Stap 13

Hoop volledig bedekken met een dikke laag van minimaal 25 cm maaisel of hooi. Dit om uitdroging te milderen. Een goede standaard-broeihoop is 1,5 meter breed, 3 meter lang en 1,2 meter hoog. Zorg dat de bovenkant een beetje hol naar het midden staat. Zo kan regenwater goed in de hoop lopen.



Stap 14

Geheel overgieten met water. Zeker de zones met paardenmest en houtsnippers. Dit om voldoende broei te krijgen.

Bij langdurig, warm weer regelmatig enkele emmers water over de hoop gieten.



De hoop wordt het beste jaarlijks voor eind april opnieuw opgezet en in oktober gecheckt op eischalen. In die periode wordt de hoop nog niet gebruikt als overwinteringsplaats en vindt geen verstoring plaats van mogelijke legsels. De eitjes worden meestal tussen 20 en 60 cm diep afgezet.